阿托伐他汀联合 脑梗死患者脑血流参数和颈动脉粥样硬 影响

宋　博[′],孙玉坤[′],何　伟[′] 朱红霞[$],王海鹏[′],苏　宏[#]

【摘要】 目的　探讨阿托 梗死患者颈动脉粥样硬化斑块和脑血流参数的影响。方法　!$. 例脑梗死患者随机分为两组,对照组 治疗,实验组 ′′/ 例在对照组治疗的基础上,加用银杏叶制剂。比较两组治疗前后颈动脉粥样硬化斑 化,同时记录用药期间不良反应。结果　实验组治疗后血流动力学指标 %U("(.! i "(′E) 、6U("(/′ i E(!/ i !(&!) DC¢F、8F(&′($$ i $(.&) DC¢F、8C(/(E& i ′(!!) DC¢F 高于对照组(+ f "(".) ;实验组治疗) DC!、27U*G(′(!) i "(′E) CC 低于对照组(+ f "(".) ;两组不良反应率无统计学差异。结论　阿托 够促进脑梗死患者血流动力学参数表达水平的恢复,改善颈动脉粥样硬化斑块,安全性高。

【关键词】 阿托伐他汀;银 流参数;颈动脉粥样硬化斑块

【中国图书分类号】 %$)#(

DOI:10.14010/j.cnki.wjyx.2

B**,-%$ "* &%"6&$%&%) & 1/,1&/&%)"($ "(-,/,3/&+ 3+""# *+"< 1&/&0,%,/$ &(# -&/"%)# &%7,/"$-+,/′)(1&%),(%$ <)%7 -,/,3/&+)(*&/-%)"(

>I<T W9′, >X< aKHK5′, \ <T _3+′, _\X \95@h4-$, ^7<T \-4N+5@′, -50 >X \95@#(′(P+N-B,J C+5, 9Z 63-BC-D= -50 MYK4NC+5, * +O4D45+, #(P+N-B,C+5, 9Z T+5+B-: >KB@+B=, ?4-9545@ 6B9L45D4-: 29BNF \9FN4,-: 9Z 2345+F+ 6+9N:+′F 7BC ′′""$#, 2345-; !(\+-:,3D-B+ G+-C 9Z 7BC= /$$!′, >3+5=-5@ ′′""$#, 2345-

【23$%/&-%】 4 35,-%)6, G9 F,-,45 -50 @45H@9 O4:9O- NB+N-B-,495F 95 D+B+OB-: O:990 Z:9A N-B-C+,+BF -50 D-B9,4O -,3+B9FD:+B9,4D N:-YK+ 4 -: 45Z-BD,495(! ,%7"#$ GA9 3K5OB+O -50 ,34B,=Z4L+ N-,4+5,F A4,3 D+BJ +OB-: 45Z-BD,495 A+B+ F+:+D,+O 45 9K O4L4O+O 45,9 ,A9 @B9KNF -DD9BO45@ ,9 ,3+ OBK@ B+@4C+5(G3+ D95,B9: @B9KN (. e ′′)) A-F ,B+-,+O A4,3 - -: @B9KN (. e ′′/) A-F -OO4,495-::= @4L+5 @45H@9 O4:9O- NB+N-B-,495F(G3+ D3-5@+F 9Z D-B9,4O -,3+B9FD:+B9 -C4D N-B-C+,+BF -50 3+C9B3+9:9@4D-: 45O+h+F A+B+ D9CN-B+O O+Z9B+ -50 -Z,+B ,B+-,C+5,(Be-50BD+O D5F(

介:宋　博,本 学历,主
者单位:′′""$#　沈 ,武警辽
#(普外科;!(′′"" 沈阳,解放军
通讯作者:苏 C-4::′""$//

! 对象与方法

!#! 对象 选择武警辽 J'. 至
!"'EJ'. 收治的脑梗死患者 ! 组，
对照组 ''）例和实验组 '' #$ g
E! 岁，平均(.)('& i !(!#) 列，病
程 # 个月 g . 年，平均('(E 年龄
#E gE. 岁，平均(./(!) i 则，女
)' 例，病程 . 个月 gE 年， 1.708 -1 Tf 1.708 -1 Tf 1.708 -1DC2 1B/F# i "(
两组年龄、性别、病程无统计学差
!#" 诊断标准 患者狡k 《
断要点》 [駿伴]中⁰关于急性脑 邵 邵抵 h亦E]行
2G、 ，证实为脑梗死

组)(/ "Q ,两组无统计学差

组间颈动脉粥样硬化斑块指标的变化情况 (¯, i -)

组别	例数	斑块面积 (DC¹)	不稳定性斑块(.; Q)			
			钙化结节性病变	破裂斑块	侵蚀性斑块	合计
实验组	''/					
治疗前		"(/) i "('	!.(! '(" ')	#E(#'(!$)	#!($)(&#)	''#(/ .(&")
治疗后		"(. ! i "('	E(.(&&) ! "	'&('.('$) ! "	'.('!(/ $) ! "	#"($$( ) ') ! "
对照组	'')					
治疗前		"(/ $ i "('	!.(! '(..)	##($E(/ $)	#'($.($#)	''"(/ #(&$)
治疗后		"( )& i "('	'#('!("E) !	!.(! '(..) !	!$('/(&$) !	)!(.$(#.) !

注: 比治疗前比较, ! + f "(".; 与对

表 $ 脑梗死患者两组间

实验组

Q)

组别

[$]　安占军,徐立霞,曹洁玲